

a7

LE CHARME PYRAMIDAL

Nom latin : *Carpinus betulus pyramidalis* **BETULACEAE**

Cet arbre est un cultivar apparu par mutation à partir du charme commun. Son feuillage est identique à celui de l'espèce type. Feuilles marcescentes (qui se flétrissent sur la plante sans s'en détacher). Le caractère pyramidal consiste en une base de branches relativement large par rapport au reste du végétal. On retrouve ce caractère chez d'autres espèces, notamment un genévrier de Virginie (*Juniperus virginiana pyramidalis*) et un Cryptomeria (*Cryptomeria japonica pyramidata*).

D'autres mutations, les arbres à port fastigié, ont des ramifications dressées et appliquées les unes contre les autres de manière à former une pyramide étroite. C'est le cas du peuplier d'Italie (*Populus nigra italica*), forme fastigiée d'origine orientale du peuplier noir ; du hêtre fastigié (*Fagus sylvatica fastigiata*), forme pyramidale à feuilles glabres et branches érigées ; du cerisier à fleurs japonais (*Prunus serrulata amanogawa*), forme fastigiée à fleurs semi-doubles roses pâles ; du chêne des Pyrénées (*Quercus pedunculata fastigiata*), de forme identique au peuplier d'Italie, très ornemental, qui se reproduit de graines de façon constante, caractère assez rare dans ces mutations.

Parmi les espèces sempervirentes, on trouve des formes fastigiées chez les Cupressus (*Cupressus sempervirens fastigiata*), chez le cyprès de Lawson (*Chameocyparis lawsoniana elwoodii*), chez le pin sylvestre (*Pinus sylvestris fastigiata*) notamment...

Toutes ces formes remarquables sont le plus souvent reproduites par greffe, bouture, marcotte, suite à leur apparition, la reproduction sexuée d'un grand nombre d'entre elles étant secondaire voire impossible.

